DR. GRIMM WIEGAND'S
DESINFEKTION

ELBOW SANITIZER DISPENSER

NAME OF PARTS



INSTALLATION GUIDE

1. Remove the plastic bottle
2. Press the square shape button, put your fingers through the hole on the back plate and pull downward to detach the back plate
3. Install the back plate to the wall / stand with the screws in the gift box
4. Align the elbow sanitizer dispenser with the back plated secured on the wall / stand by sliding down until you hear a "click sound"
5. Simply hang the metal frame on the elbow sanitizer dispenser and put the tray on the metal frame

REFILL & CLEANING INSTRUCTION

1. Remove the plastic bottle
2. Clean the elbow sanitizer dispenser, bottle, metal frame and tray with wet cloth
3. Refill the sanitizer liquid (NOT included in the box) to the bottle
4. Install the filled bottle to the elbow sanitizer dispenser carefully

USAGE

1. Put approximatly 5ml (3 doses) of sanitizer liquid in the palm of your hand, using the elbow of your other arm to operate the dispenser

2. Rub both of your forearm and elbow for 10-15 seconds until the sanitizer liquid is fully evaporated

3. Put approximatly 5ml (3 doses) of sanitizer liquid in the palm of your hand, using the elbow of your other arm to operate the dispenser

4. Rub both of your hands from fingertips, palm, wrist and back for 10-15 seconds until the sanitizer liquid is fully evaporated



DR. GRIMM WIEGAND'S
DESINFEKTION

ARMHEBEL-SPENDER

BESTANDTEILE



MONTAGEANLEITUNG

1. Kunststoffbehälter entfernen
2. Rechteckigen Knopf drücken, Finger durch Loch in der Rückplatte stecken und diese nach unten ziehen und ablösen
3. Rückplatte mit mitgelieferten Schrauben an Wand oder Ständer montieren
4. Spender an montierter Platte anbringen (einschieben, bis klickendes Geräusch zu hören ist)
5. Metallrahmen an Spender anhängen und Abtropfschale am Rahmen anbringen

BEFÜLLUNG UND REINIGUNG

1. Kunststoffbehälter entfernen
2. Spender, Behälter, Metallrahmen und Abtropfschale mit feuchtem Tuch reinigen
3. Behälter mit Desinfektionsmittel (nicht im Lieferumfang enthalten) befüllen
4. Befüllten Behälter vorsichtig in Spender einsetzen

ANWENDUNG

1. Mit einem Ellbogen Hebel betätigen und ca. 5 ml (3 Pumpstöße) Desinfektionsmittel auf Handfläche der anderen Hand auftragen

2. Unterarme und Ellbogen 10-15 Sekunden mit Desinfektionsmittel einreiben, bis Flüssigkeit verdampft ist

3. Mit einem Ellbogen Hebel betätigen und nochmals ca. 5 ml (3 Pumpstöße) Desinfektionsmittel auf Handfläche der anderen Hand auftragen

4. Beide Hände von den Fingerspitzen über die Handfläche bis zum Handgelenk und zum Handrücken 10-15 Sekunden mit Desinfektionsmittel einreiben, bis Flüssigkeit verdampft ist