

DOSIER-TABELLE für HEXAWOL® Flächendesinfektion

DVG-Listung vom 25.04.2016

Allgemein
(Wischen mit hoher organischer Belastung)

Einwirkzeit	15 Min.	30 Min.	1 Std.
Gewünschte Ansatzmenge an Desinfektionsreinigerlösung	2,5%	2,0%	1,0%
1,0 Liter	25 ml	20 ml	10 ml
2,0 Liter	50 ml	40 ml	20 ml
3,0 Liter	75 ml	60 ml	30 ml
4,0 Liter	100 ml	80 ml	40 ml
5,0 Liter	125 ml	100 ml	50 ml
6,0 Liter	150 ml	120 ml	60 ml
7,0 Liter	175 ml	140 ml	70 ml
8,0 Liter	200 ml	160 ml	80 ml
9,0 Liter	225 ml	180 ml	90 ml
10,0 Liter	250 ml	200 ml	100 ml

Hinweis:

Die gesamte Flächendesinfektionslösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Flächendesinfektionskonzentrat und der Differenzmenge an Wasser.

Beispiel:

$$\begin{aligned}
 &10 \text{ L} / 2 \% \text{ige Gebrauchslösung} = \\
 &\quad 200 \text{ ml Flächendesinfektion-Konzentrat} \\
 &\quad + 9.800 \text{ ml Wasser} \\
 &\quad \hline
 &= 10 \text{ L fertige Flächendesinfektionslösung}
 \end{aligned}$$

geprüft nach / gegen Dosierung Einwirkzeit

VAH (ehem. DGHM) / ÖGHMP	2,5%	15 Min.
hohe org. Belastung	2%	30 Min.
	1%	60 Min.
befüllte Viren (HBV, HIV, HCV)	2,5%	5 Min.
begrenzt viruzig gem. RKI/DVV-Leitlinie)	2%	15 Min.
Papova-/Polyoma-Viren	7,5%	2 Min.
	2%	30 Min.
Rota-Viren	0,5%	30 Sek.