

# Softasept® ISO 70 %

Gebrauchsfertiges, alkoholisches  
Hautdesinfektionsmittel

## Eigenschaften

- Farbloses, alkoholisches Hautdesinfektionsmittel
- Kurze Einwirkzeit (ab 15 Sekunden)
- Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
- Als Sprechstundenbedarf abrechenbar

## VAH-gelistet

## Wirkspektrum/Einwirkzeiten (EZ)

Einsatzgebiet	EZ
bei talgdrüsenarmer Haut* vor Injektionen und Punktionen vor Gelenkpunktionen, Punktionen des Liquorraumes und vor Operationen	mind. 15 Sek. mind. 60 Sek.
bei talgdrüsenreicher Haut* (z. B. am Kopf, über dem Brustbein, zwischen den Schulterblättern) vor allen Eingriffen	mind. 10 Min.

\* nach VAH-Richtlinien

## Indikationen

Zur Hautdesinfektion vor:

- Injektionen und Punktionen (z. B. Blutentnahmen, Impfungen)
- Operativen Eingriffen



schnell wirksam

## Hinweise zur Anwendung

Softasept® ISO 70% unverdünnt auftragen und zu behandelnde Hautpartien vollständig benetzen. Während der vorgeschriebenen Einwirkungszeit feucht halten. Nach der Einwirkungszeit trocknen lassen. Bei der präoperativen Hautdesinfektion „Pfützenbildung“ unter dem Patienten wegen möglicher Hautreizungen vermeiden. Vor Anwendung elektrischer Geräte muss das Präparat auf der Haut vollständig abgetrocknet sein.

Lieferform	VE	Art.-Nr.	PZN
250 ml-Sprühflasche	20	19905	12372600
1000 ml-Flasche	10	19906	12372617
5 Liter-Kanister	1	19907	12372623
Handsprühkopf für 1000 ml-Flasche	1	3908012	–

### Softasept® ISO 70%

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* 2-Propanol (Ph. Eur.) 63,1 g. *Sonstige Bestandteile:* Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. **Gegenanzeigen:** Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit Softasept® ISO 70% können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Pfützenbildung unter dem Patienten vermeiden. Leichtentzündlich! Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen. Bei Verschütten der Lösung unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B.: Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit, Verdünnen mit Wasser, Lüften des Raumes, Beseitigen von Zündquellen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten mit Wasser spülen. **Stand der Information:** Mai 2016. **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen