



Gebrauchsfertiges Hautantiseptikum zur präoperativen Behandlung der Haut, vor Inzisionen, Punktionen und Injektionen

Anwendungsbereiche:

Poly-Alcohol Haut...farblos/gefärbt Antisepticum ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur präoperativen Behandlung der Hautpartien sowie zur Verwendung als Hautantiseptikum vor Inzisionen, Punktionen und Injektionen. Es zeichnet sich durch eine schnelle Wirksamkeit aus und unterstützt eine gute Hauthaftung bei der Verwendung von OP-Folie.

Das farblose Produkt kann bei Bedarf auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden.

Poly-Alcohol Haut-Antisepticum ist je nach Bedarf und Anwendungsbereich als farblose und gefärbte Lösung erhältlich.

Besondere Eigenschaften:

- breites Wirkungsspektrum
- schnelle und sichere Wirkung
- angenehm im Geruch
- farblose und gefärbte Variante erhältlich

Wirkungsspektrum:

- bakterizid
- levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid*

Zusammensetzung (Wirkstoffe):

100 ml enthalten:
70 ml 2-Propanol

Anwendungsempfehlung:

Prüfung	Konzentration	Einwirkzeit
VAH – Hautdesinfektion DGHM-Standardmethoden		
Talgdrüsenarme Haut:		
• vor Injektionen und Punktionen	unverdünnt	15 s
• vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen, sowie operativen Eingriffen	unverdünnt	60 s
Talgdrüsenreiche Haut:		
• vor Punktionen und Operationen	unverdünnt	3 min
VAH – Händedesinfektion DGHM / EN-Standardmethoden (farblos)		
VAH – hygienische Händedesinfektion DGHM / EN 1500	unverdünnt	30 s
VAH – chirurgische Händedesinfektion DGHM / EN 12791	unverdünnt	1,5 min
DVV / RKI-Leitlinie – viruzide Wirkung		
begrenzt viruzid* (inkl. HIV / HBV / HCV)	unverdünnt	30 s
Vacciniavirus	unverdünnt	30 s
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)	unverdünnt	30 s
RKI-Listung (farblos)		
Wirkungsbereich A	unverdünnt	30 s

* gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit / klare, orangefarbene Flüssigkeit
Geruch: alkoholisch
pH-Wert: 6 - 8 bei 20 °C
Dichte: ca. 0,876 g/cm³ bei 20 °C
Flammpunkt: 21,5 °C gem. DIN 51755

Listung:

- VAH-Liste
- ÖGHMP-Liste
- RKI-Liste Wirkungsbereich A (farblos)

ANTISEPTICA



ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
Rechtsnachfolger von ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11
E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **ISO 9001** sowie **EN ISO 13485** und erfüllt die Anforderungen der **Richtlinie 93/42/EWG** des Rates über Medizinprodukte.

ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
A-1020 Wien, Handelskai 388 / Top 641
Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66
E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Bezeichnung:

Poly-Alcohol Haut...farblos/
gefärbt Antisepticum

Zusammensetzung:

100 ml Lösung zur Anwendung auf der
Haut enthalten:

Wirkstoff: 2-Propanol 70,0 ml

Sonstige Bestandteile: gereinigtes

Wasser, Butan-1,3-diol, Parfümöl Fresh

Gefärbt: Gelborange S, Chinolingelb

Pharmazeutischer Unternehmer:

ANTISEPTICA Dr. H.-J. Molitor GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 7

50259 Pulheim

Anwendungsgebiete:

Zur Hautdesinfektion vor Operationen,
Inzisionen, Punktionen und Injektionen
sowie zur hygienischen und chirurgischen
Händedesinfektion (farblos).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Zur Hautdesinfektion:

Unverdünnt auf die Haut auftragen.

Talgdrüsenarme Haut

- vor Injektionen und Punktionen
15 Sekunden feucht halten.
- vor Punktionen von Gelenken,
Körperhöhlen, Hohlorganen sowie
operativen Eingriffen mindestens
60 Sekunden feucht halten.

Talgdrüsenreiche Haut

- vor Punktionen und Operationen
mindestens 3 Minuten feucht halten.

Zur hygienischen Händedesinfektion

(farblos): Unverdünnt in die Hände
einreiben, diese während 30 Sekunden
feucht halten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion

(farblos): Unverdünnt in die Hände und
auf die Unterarme einreiben, diese
während 1,5 Minuten feucht halten.

Eine begrenzt viruzide Wirkung wird
in-vitro nach 30 Sekunden erzielt.

Gegenanzeigen: Dieses Arzneimittel darf
nicht angewendet werden, wenn Sie
allergisch gegen 2-Propanol, oder einen
der sonstigen Bestandteile sind. Nicht im
Augenbereich, auf der Schleimhaut oder
offenen Wunden anwenden.

Nebenwirkungen:

Mögliche bekannte Nebenwirkungen sind
Hautirritationen oder Hauttrockenheit
sowie kontaktallergische Reaktionen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken,
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apo-
theker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen,
die nicht in dieser Packungsbeilage
angegeben sind. Sie können Nebenwir-
kungen auch direkt dem Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.
Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-
Allee 3, D-53175 Bonn, Website:
www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie
Nebenwirkungen melden, können Sie
dazu beitragen, dass mehr Informationen
über die Sicherheit dieses Arzneimittels
zur Verfügung gestellt werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwen- dung und Warnhinweise:

Nicht ver-
schlucken oder in den Blutkreislauf
gelangen lassen. Kontakt mit den Augen
sollte vermieden werden. Bei versehent-
lichen Spritzern ins Auge sofort gründlich
mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt
konsultieren. Die enthaltenen Duftstoffe
können allergische Reaktionen auslösen.
Bei Säuglingen darf dieses Arzneimittel
nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet
werden.

Wechselwirkungen mit anderen

Arzneimitteln: Keine bekannt.

Zur Beachtung: Alkoholhaltig, brennbar.
Vor Anwendung elektrischer Geräte
Hände gut trocknen lassen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker.

Lieferformen:

- Karton mit 30 x 200 ml Sprühflaschen
- Karton mit 10 x 1 L Flaschen
- Karton mit 2 x 5 L Kanistern

zusätzlich lieferbar:

- Wandspender für 1 L Flaschen
- Dosierpumpe für 1 L Flaschen
- Dosierpumpe für 5 L Kanister

Pharmazentralnummern:

farblos

- 200 ml: PZN 05905148
- 1 L: PZN 05905131

gefärbt

- 200 ml: PZN 05905160
- 1 L: PZN 05905154

Das Präparat wird hergestellt in Überein-
stimmung mit den internationalen Quali-
tätsmanagementsystemen ISO 9001 und
EN ISO 13485.

Beim Umgang mit dem Produkt sind die
Hinweise gemäß Gefahrstoffverordnung
im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf
Anfrage bei Ihrem Fachberater oder
auf unserer Homepage.

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformation lesen.*

Zugelassenes Arzneimittel gem. AMG
Zulassungsnr. farblos: 2931.00.00
Zulassungsnr. gefärbt: 2930.00.00

ANTISEPTICA



ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH

Rechtsnachfolger von ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH

D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7

Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11

E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **ISO 9001** sowie **EN ISO 13485**
und erfüllt die Anforderungen der **Richtlinie 93/42/EWG** des Rates
über Medizinprodukte.

ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH

A-1020 Wien, Handelskai 388 / Top 641

Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66

E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at