

# Autoderm® Extra



Hautantiseptik von Kopf bis Fuß



# Autoderm® Extra



Autoderm® Extra schützt Ihre Haut professionell vor dem Eindringen von Bakterien und Pilzen. Diese Extra-Prophylaxe für den ganzen Körper garantiert sichere Hautantiseptik, auf die Sie sich verlassen können.

## Unsere Leistung

Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren

Wirksam gegen Hautpilze (Trichophyten, mentagrophytes)

Wirksam gegen Papovaviren

Wirkstoffbasis Alkohol

Gebrauchsfertige Lösung zum Aufsprühen

Umfüllhilfen, Dosierhilfen

## Ihr Nutzen

Sichere Antiseptik in allen Bereichen und allen Indikationen

Schutz vor auf der Haut vorkommenden Fußpilzerregern

Effiziente Prophylaxe gegen Warzenbildung

Schnelle Einwirkzeit  
Verhindert Re-Infektionen  
Wirkt desodorierend und schweißhemmend  
Kühlt, erfrischt, belebt

Schnelle und einfache Applikation

Einfaches Handling ist gewährleistet

## Anwendungsgebiete

- Zur präoperativen Hautantiseptik
- Zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel

### Anwendungsgebiet Anwendungsempfehlung

Anwendung an talgdrüsenarmer Haut:

- Vor Punktionen und Injektionen Konzentriert mind. 15 Sekunden

- Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen, sowie vor operativen Eingriffen Konzentriert mind. 1 Minute

Anwendung an talgdrüsenreicher Haut:

- Vor allen Eingriffen Konzentriert mind. 10 Minuten

Begutachtete

Wirksamkeit gegen Trichophyton mentagrophytes Konzentriert mind. 15 Sekunden

Begutachtete

Wirksamkeit gegen Papova-Viren Konzentriert mind. 3 Minuten

## Gutachten

**Prof. Dr. med. K.-O. Gundermann, Kiel, 26.09.2002**

Untersuchung des Präparates Autoderm Extra auf seine Eignung als Hautdesinfektionsmittel

**Prof. Dr. P. Heeg, Tübingen, 08.11.2002**

Eignung von Autoderm Extra zur Hautdesinfektion

**U. Bäumer, R. Scholtyssek, Düsseldorf, 29.11.2002**

Gutachten über die fungizide Wirkung von Autoderm Extra gegenüber Trichophyton mentagrophytes im quantitativen Suspensionstest in Anlehnung an die Europäische Norm EN 1275 (Basistest für chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika, Phase 1)

**Dr. J. Steinmann, Bremen, 15.01.2001**

Hepatitis B-Wirksamkeit von Autoderm Extra

**U. Bäumer, Prof. Dr. M. Heinzel, Düsseldorf, 25.09.2002**

Gutachten über die Virus-inaktivierende Wirksamkeit von Autoderm Extra bei Raumtemperatur im Virussuspensionstest gegenüber SV40-Tumorvirus St. 777 in Anlehnung an die Richtlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV)

**Dr. med. W. Matthies, Düsseldorf, 15.11.2002**  
Autoderm Extra – Dermatologische Bewertung

**Dr. E. Schrader, Dr. N. Fedtke, Düsseldorf, 19.09.2002**

Autoderm Extra – Toxikologische Bewertung

**Dr. H. Biering, Dr. H. Berger, Düsseldorf, September 2002**

Ökologische Bewertung für Autoderm Extra

## Gebindeformen

350 ml Sprühflasche 24 x 350 ml **FPP 35**

5 L Kanister 1 x 5 L **FPP 5**



Autoderm® Extra  
Sprühflasche und Kanister

**Zusammensetzung:** 100 g Autoderm Extra Lösung enthalten: **Arzneilich wirksame Bestandteile:** 46 g Ethanol (96% MEK-vergällt), 27 g 2-Propanol, 1 g Benzylalkohol. **Sonstige Bestandteile:** Wasserstoffperoxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur präoperativen Hautantiseptik. Zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik großflächiger, offener Wunden geeignet. Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht bei Neugeborenen anwenden. Unverträglichkeit gegen die Inhaltsstoffe. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung/Warnhinweise:** Leicht entzündlich; nicht in Flammen sprühen; Flammpunkt (nach DIN 51755): 21°C. Anwendungsdauer und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt mind. 1 Minute antrocknen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Im Originalgebinde und nicht über 25°C lagern. Unverbrauchtetes Arzneimittel sachgerecht entsorgen. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Bisher keine bekannt. Jede Nebenwirkung soll dem Arzt oder Apotheker gemeldet werden.  
Zul.-Nr. 19019.00.00

# ECOLAB®

Ecolab Deutschland GmbH  
Postfach 13 04 06  
D-40554 Düsseldorf  
Telefon 02 11 / 98 93-0  
Telefax 02 11 / 98 93-3 84

www.ecolab.com